



Liste rouge des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon au cours des 20 dernières années

Juin 2003

- Noms français issus de la Liste nationale des oiseaux du Paléarctique occidental, Le Maréchal et Dubois, 2003
- Légende des symboles de la liste rouge nationale, d'après « *Oiseaux menacés et à surveiller en France, SEOF-LPO, 1999* ».
- Le classement des espèces dans telle ou telle catégorie de menace s'est basé sur les effectifs minimum connus
- Les effectifs pour lesquels aucune année de référence n'est signalée correspondent aux dernières données récoltées en 2003

Catégories de menace		N° de code	Etat de la population en Languedoc-Roussillon
Espèce en danger	E	1	Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples
	E	2	Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples
	E	3	Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples
Espèce vulnérable	V	4	Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 300-3000 couples
	V	5	Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples
	V	6	Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 couples
	V	7	Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples
	V	8	Espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec des effectifs < 10 couples
Espèce rare	R	9	Population régionale <300 couples mais menacée du fait de sa petite taille
Espèce localisée	L	10	Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans quelques sites ou habitats limités
Espèce en déclin	D	11	Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples
	D	12	Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples
Espèce à surveiller	S	13	Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller
Espèce disparue	Ex	14	Espèce disparue
Espèce inclassable	I	15	Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée menacée
	LR	16	Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. nationale mais qui n'entre pas dans les catégories précédentes

Espèces (nom usuel)	Nom scientifique	Liste rouge		Localisation :					Commentaires	Rappel (F) Liste rouge	Rappel (CEE) Directive Oiseaux
				+ : nicheur ; (+) : disparu ; ? : à confirmer							
		Languedoc-Roussillon		Lozère	Gard	Hérault	Aude	P.-O.			
Podicipédiformes											
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	R	9	+	+	+	+	+	Peu abondant, stable ou en légère expansion		
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	S	13		+			+	1 cas probable (G.), 1 cas dans P.-O. (Barcarès, 1998)	R	
Ciconiiformes											
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	R	9		+	+	+	+	Répartition diffuse localisée au niveau des phragmitaies des étangs de la plaine littorale et de quelques plans d'eau intérieurs (74 mâles chanteurs en LR en 2000)	V	OI
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	E	2		+	+	+	+	Localisé (littoral et petits lacs de retenue de l'intérieur)	E	OI
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	V	5	?	+	+	+	?	Effectifs en cours d'évolution à préciser dans H., L., P.O.		OI
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	V	6		+				Uniquement en Camargue gardoise (100 c. en 2001)	V	OI
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	L	10		+	+	+	+	En phase d'accroissement de son aire vers le sud		
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	L	10		+	+	+	+	En phase d'accroissement de son aire vers le sud		OI
Grande Aigrette	<i>Egretta alba</i>	V	8		+	+	+		Très localisée. A rechercher dans H.	V	OI
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	D	11		+	+	+	+	En régression lente	D	OI
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	V	8		+	+	+	+	Très localisée : A. : 2 c. (réserve de Sigean), H. : 5 c., G. : 2 c., P.O. : 1 c. (en 1999)	R	OI
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	S	13		+		+		Occasionnel sur un site dans A., sur plusieurs sites en G.		OI
Ansériformes											
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	V	6		+	+			Localisé (G. : 15 et H. : 1)	R	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	R	9		+			+	Localisé (G.) après le fort déclin des années 1950-60, lagunage de Barcarès en 2002 et 2003 (P.O.)	V	OII/1

Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	S	13		+	+	?	+	Occasionnel dans les 3 départements	R	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	S	13		+	+	+	+	Occasionnel dans les 4 départements	E	OII/1
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	R	9		+	+	?	+	En régression en Camargue ; sporadique en P.O.	E	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	S	13		+				Occasionnel (G.)	R	OII/1, OII/2
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	V	7		+	+	+		Occasionnel sur les étangs littoraux (G., H., A. (1c.en 2003))	D	OII/1, OII/2
Accipitriformes											
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	V	8		+				Occasionnel dans G. (1 c. en 1998)	V	OI
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	V	6	+			+	?	Majoritairement en L. 0 à 1 couples dans A., à confirmer dans les P.O. et G. (26-72 c. en LR)		OI
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	V	8					+	1 c. dans P.O. (2003)	E	OI
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	V	8	+					Réintroduit, amorce sa reconquête des Causses (5 couples en L. en 2002)	V	OI
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	R	9	+			(+)		Réintroduit, en augmentation régulière (80-85 couples en L.). A niché dans H. de 1995 à 1998 suite à sa réintroduction puis a déserté le site	R	OI
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	E	2	+	+	+	+		En déclin. Depuis 2002, 3 c. dans A.	V	OI
Espèces (nom usuel) nom scientifique	Nom scientifique	Liste rouge		Localisation + : nicheur ; (+) : disparu ; ? : à confirmer					Commentaires	Rappel (F) Liste rouge	Directive Oiseaux
		<i>Languedoc-Roussillon</i>		<i>Lozère</i>	<i>Gard</i>	<i>Hérault</i>	<i>Aude</i>	<i>P.-O.</i>			
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	D	11	+	+	+	+	+	En déclin, distribution diffuse et fortes fluctuations inter-annuelles		OI
Busard saint Martin	<i>Circus cyaneus</i>	R	9	+	+	+	+	+	Hors zone méditerranéenne		OI
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	R	9		+	+	+	+	81-112 c. en LR		OI
Autour des Palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	I	15	+	+	+	+	+			
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	E	2		+	+	+	(+)	En déclin à nouveau après une période de relative stabilité (8 c. en LR)	E	OI
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	I	15	?	?	?	+	+	Effectifs mal connus (au moins 20 couples dans A.)	R	OI
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	V	6	+	+	+	+	+	En légère augmentation sur l'ensemble de la région	R	OI
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	D	11	+	+	+	+	+	Environ 500 c. en LR	R	OI
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	V	6		(+)	+	+		Nouvellement installé dans H. (2002) et A. (2003), disparu de G. en 1992 (13 c. en LR).	E	OI
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	I	15	+	+	+	+	+	En déclin probable, mais effectifs mal connus		
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	R	9	+	+	+	+	+	En légère augmentation (60-78 c. en LR)	R	OI
Galliformes											
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus pyrenaicus</i>	V	5				?	+	En régression lente		OI, OII/1, OIII/2
Grand Tétraz pyrénéen	<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	V	5					+	En régression lente	D	
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>	I	15	?			?	?	Présence à confirmer dans P.O, L. et A.	D	OI, OII/2
Perdrix grise de montagne	<i>Perdix perdix armoricana</i>	E	2	+					En forte régression		
Perdrix grise de montagne	<i>Perdix perdix pyrenaicus</i>	V	4				+	+	Effectifs très fluctuants	D	
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	D	11	+	+	+	+	+	Encore abondante localement, en régression	AP	OII/2
Gruiformes											
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	S	13		+	+	+	+	Abondant, tendance d'évolution mal connue	AP	OII/2

Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	S	13		+	+	?	?	Quelques nidifications localisées	E	OI
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	V	6		?	?	+	+	Petite pop. localisée au sud des P.O. (depuis 1996) et dans l'Aude. Présente dans G. et H., nidification à prouver		OI
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	L	10	?	+	+	+		En progression dans G. et H. Les pop. audoises et lozériennes qui sont marginales sont peut-être soumises à fluctuation (360-400 mâles chanteurs en LR en 2001)	E	OI
Charadriiformes											
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	R	9		+	+	+	+	Quelques dizaines de couples, apparemment stables	R	OI2
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	L	10		+	+	+	+	Effectifs fluctuants sur les 4 départements littoraux. Maxi 1 200 c. en 1999.		OI
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	L	10		+	+	+	+	500-600 c. en LR. Occasionnelle dans les P.O. (1977 et 2000)	L	OI
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicanus</i>	V	5	+	+	+	+	+	Situation variable selon les départements. Déclin dans G.	D	OI
Espèces (nom usuel) nom scientifique	Nom scientifique	Liste rouge		Localisation + : nicheur ; (+) : disparu ; ? : à confirmer					Commentaires	Rappel (F) Liste rouge	Rappel (CEE) Directive Oiseaux
		Languedoc -Roussillon	Lozère	Gard	Hérault	Aude	P.-O.				
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	V	6		+	+		+	Occasionnelle depuis 1995 dans H., régulière depuis 1996 dans G. et un cas dans les P.O en 1978	E	OI
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	D	11		+	+	+	+	En déclin localement (notamment en H.)	R	
Pluvier guignard	<i>Eudromias morinellus</i>	V	8					+	Reste rarissime (P.O. en montagne), 1 à 2 couples réguliers	E	OI
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	E	2	+	+	+	+		En déclin en L. (10-50 c.). Nidification isolée, mais régulière sur le littoral. Colonie intérieure en 2002 dans A. et en 2003 en P.O.	D	OII/2
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	V	6	+					Une dizaine de couples dans le nord de L.		OII/2
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	S	13		?	?			Nidifications épisodiques dans G.	V	OII/2
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	V	6		+	+	+		Quelques dizaines de couples nicheurs sur le littoral sauf P.O.	R	OII/2
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	V	6	+	?	?	?	+	Rares nidifications confirmées (ex : 1 pour les P.O.)	R	
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	S	13	+	+	+	+	+	Statut mal connu dans 4 départements. En augmentation sensible en L. Soumise à des fluctuations inter-annuelles en L.		OII/1, OIII/2
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	S	13	?	+	+			Quelques nidifications sporadiques (H., G.)	E	OII/1, OIII/2
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	L	10		+	+			Essentiellement dans G. et H. (1300 c. en LR)	R	OI
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	L	10		+		+		Presque uniquement en G. (avant 2002). A niché dans A. en 1988.	R	OI
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	L	10		+	+	+		Pop. confinée sur un seul site en Camargue. Récemment en H. (4 c.) et A. (1-2 c.) en 2003	R	OI
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	L	10		+	+	+		Pop. répartie sur moins de 10 sites	L	OI
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	L	10		+	+	+		Globalement stable (entre 400 et 600 c.). En phase d'accroissement de son aire vers le sud		OI
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>	D	11		+	+	+	+	Pop. en diminution de moitié depuis 1991(400 c. actuellement.) Colonies instables.	R	OI
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	S	13		+	+	+		Occasionnelle en H., G. et A.		OI

Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	S	13			+				Nidifications épisodiques en G.	V	OI	
Columbiformes													
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	S	13	+	+	+			+	Evolution de la population à préciser	AP	OII/2	
Cuculiformes													
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	LR	16	+	+	+	+	+		Niche en plaine. Reste en marge en L.	R		
Strigiformes													
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	V	6	+	+			+	+	Population mal connue		OI	
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	D	11	+	+	+	+	+		Population en régression sur l'ensemble de la région, sauf dans les P.O. où elle semble stable	D		
Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	LR	16	+	+	+	+	+		Pop. apparemment stable	R	OI	
Petit-Duc scops	<i>Otus scops</i>	D	11	+	+	+	+	+		Pop. en régression lente			
Espèces (nom usuel)	Nom scientifique				Localisation						Commentaires	Rappel (F) Liste rouge	Rappel (CEE) Directive Oiseaux
					+ : nicheur ; (+) : disparu ; ? : à confirmer								
				Languedoc - Roussillon	Lozère	Gard	Hérault	Aude	P.-O.				
Apodiformes													
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	L	10			?	+	+	+	Pop. mal connue dans G.	R		
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	R	9	+	+	+	+	+	+	Colonies peu importantes dans les 5 départements			
Coraciiformes													
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	D	11			+	+	+	+	En régression localement dans G. et H.			
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	LR	16			+	+	+	+	En déclin localement, en progression (P.O)	R	OI	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	D	11	+	+	+	+	+	+	En déclin localement dans les 5 départements	D		
Piciformes													
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	S	13	+	+	+	+	+	+	Effectifs mal connus	D		
Pic vert de Sharpe	<i>Picus viridis sharpei</i>	S	13				+	+	+	Répartition de cette sous-espèce en cours d'étude			
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	E	3	+						Récemment retrouvé en L.	I	OI	
Passériformes													
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	E	1			(+)	?	+		Effondrement des dernières populations connues, dernières nidifications dans A. en 1999 et 2000	E	OI	
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	S	13	+	+	+	+	+	+	En déclin localement, effectif mal connu. Au bord de l'extinction en H.		OI	
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	S	13	?	+	+	+	+	+	A surveiller	D		
Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>	R	9					+	+	En déclin probable (fermeture des milieux), 200-220 c. en en 2003	V	OI	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	L	10			+	+	+	+	Nidification irrégulière selon disponibilités en sites			
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>	V	6			+	+	+	+	Rare, mais population stable	V		
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	S	13	+	+	+	+	+	+	Rare et localisé			
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	LR	16	+	+	+	+	+	+	En déclin probable (fermeture des milieux)		OI	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava flava</i>	R	9	+						Petite pop. au-dessus de 1000 m. (Lozère)			
B. printanière ibérique	<i>Motacilla flava iberiae</i>	LR	16			+	+	+	+	Petite population littorale et en Cerdagne, mal connue			
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	R	9					+	+	Petite pop. pyrénéenne			
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	V	4	+	+	+	+	+	+	Rare et localisé dans H. et G.	V		
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	Ex	14				?	?	(+)	Disparu des Albères en 1997	E	OI	
Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>	S	13			+	?	?	?	Cantonnée en période de reproduction (G., H., A. et P.O. (2002)) confirmée nicheuse en G.	D		

Locustelle tâchetée	<i>Locustella naevia</i>	I	15	+		?				Inféodée aux landes à genêts en L.		
Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	LR	16		+	+	+	+		Stable dans les 4 départements littoraux	R	OI
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	L	10		+	+	+	+		Tendance régionale à évaluer	D	
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>	R	9	?	+	+	+	+		En lente régression ; pop. à 1300 m. dans P.O.	V	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	V	6	+			+			Confirmé nicheur en L.		
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	L	10	+						En limite de répartition méridionale en L.		
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	L	10	+	+					Localisé dans le Gard et en L.		
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	L	10		+	+	+	+		Populations fluctuantes, présente sur les 4 départements littoraux	L	
Espèces (nom usuel)	Nom scientifique	Liste rouge	Localisation					Commentaires	Rappel (F) Liste rouge	Rappel (CEE) Directive Oiseaux		
			+ : nicheur ; (+) : disparu ; ? : à confirmer									
		Languedoc-Roussillon	Lozère	Gard	Hérault	Aude	P.-O.					
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	E	3					+		Rarissime ; massif du Canigou (P.O.)	R	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	E	1		(+)	(+)	?	+		En déclin rapide dans les P.O.(1 à 2 c. en 2002)	V	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	R	9	+						En limite de répartition méridionale	D	
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	LR	16	+	+	+	+	+		Effectifs et répartition mal connus	V	
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	E	2		+	+	+	(+)		Petites pop., en déclin récemment, disparue des P.O.	E	OI
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	LR	16	?	+	+	+	+		Localement abondante, en régression (P.O.)	D	
Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	LR	16		?	+	+	+		Encore rare, en augmentation lente		
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	R	9				?	+		Localisé, effectifs très faibles dans les P.O.		
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	S	13	+	+	+	+	+		En régression (A.), ailleurs apparemment stable	I	OI
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	S	13					+	+	Rare et localisé dans les P.O. et A.	R	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	R	9	+	+	+	?	+		Localement en moyenne montagne		
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	L	10	+	+	+	+	+		Petites populations inféodées aux roselières		
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	LR	16	+	+	+	+	+		Déclin général à confirmer avec l'enquête 2004	D	OI